

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

LP-2-6-72 39770

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

25,00 F

Régie de Recettes de la D. D. A.

Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux, Cité Administrative, Rue Pélissier,

C. C. P. : CLERMONT-FERRAND 5.503-17

63034 CLERMONT-FERRAND CEDEX

BULLETIN N° 141 de JUIN 1972.-

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE.- (Poiriers et Pommiers)

Quoiqu'ayant considérablement diminué, les risques de contaminations primaires demeurent.

Poursuivre les traitements dans les vergers situés en lieux favorables à la maladie, ainsi que dans ceux où les infections primaires n'ont pu être évitées (dans ces vergers des taches plus ou moins nombreuses sont visibles sur les feuilles).

1' Oïdium.

Sur Pommiers, si nécessaire, poursuivre la lutte contre

Contre le Carpocapse, il est encore trop tôt pour intervenir.

ANTHRACNOSE DU CERISIER.- (Cylindrosporiose)

Contre cette maladie, courante depuis quelques années dans certaines plantations, traiter avec l'un des produits suivants : doguadine, folpel, manèbe ou, sauf en pépinière, oxyquinolée de cuivre.

La doguadine sera, seule utilisée, au cas où ce traitement serait effectué moins de 15 jours avant la récolte.

ROUILLE DU PRUNIER.-

Dans les vergers où cette maladie est habituellement à craindre, traiter avec une spécialité à base de carbatène, de folpel, de mancozèbe, de manèbe, de méthylthiophanate, de tétrachloro-isophthalonitrile, de zinèbe ou de zirame.

ARAIGNEES ROUGES.- (Panonychus ulmi)

Dans certaines situations, les attaques sont importantes : s'il y a lieu, sur les essences intéressées, intervenir avec un acaricide spécifique.

MOUCHE DE LA CERISE.-

Sur les variétés habituellement attaquées, effectuer un traitement entre le 12 et le 16 Juin.

Pour les pesticides à utiliser, et leur délai d'emploi avant la récolte, consulter les bulletins d'AVRIL et de MAI 1972.

BETTERAVES

PEGOMYIE.- (Mouche de la betterave)

de jours.

Des attaques peuvent être observées depuis déjà une vingtaine

P./...311

En cas d'intervention (des attaques importantes sur jeunes betteraves peuvent être préjudiciables), choisir de préférence un pesticide à la fois efficace contre la Pégomye et les Pucerons (pour les produits à utiliser, consulter le bulletin n° 139 d'AVRIL).

V I G N E

MILDIOU.-

Localement, en particulier dans les endroits bien exposés, des infections primaires ont pu se réaliser.

Ces contaminations sont encore peu nombreuses, mais elles prendront de l'extension à l'occasion de la prochaine période favorable.

Il est conseillé d'effectuer un premier traitement, si possible, avant le 4 Juin.

OIDIUM.-

Intervenir dans les endroits favorables sur les cépages sensibles. (A signaler que les produits soufrés sont également efficaces contre l'Acariose et l'Erinose).

ARAIGNEES ROUGES.- (Panonychus ulmi)

Localement, les attaques sont importantes : intervenir, s'il y a lieu.

TORDEUSES DE LA GRAPPE.- (Cochylis et Eudémis)

Dans l'ensemble, les conditions climatiques n'ont pas été favorables à ces ravageurs, dont le premier vol a été observé à partir du 8 Mai : n'effectuer un traitement que dans les clos où les attaques sont habituellement graves.

Clermont-Ferrand, le 30 Mai 1972.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux :

P. DENIZET.

Imprimerie de la Station "AUVERGNE & LIMOUSIN"

Directeur-Gérant : L. BOUYX.

Tirage n° 834 du 30 Mai 1972 - ABONNEMENT 1972 - Expédition n° 13.

Dernière note parue : Supplément n° 1 au Bulletin n° 140, le 15 Mai.